

suspender el tratamiento. Si son positivos, tratar como una listeriosis "clásica", 4-6 semanas.

- En embarazadas, examen obstétrico.

ACTUACIÓN ANTE INFECCIÓN CON DATOS DE GRAVEDAD (SEPSIS, MENINGITIS)

- Realizar hemocultivos, punción lumbar si procede para bioquímica, contaje celular y pruebas microbiológicas, y el resto de las pruebas diagnósticas habituales en esta situación clínica.
- En ausencia de meningitis, iniciar (tras los cultivos) ampicilina 2 gr/4-6h IV y ceftriaxona 1 gr IV/24h; valorar añadir gentamicina 5 mg/kg/día. En caso de meningitis, iniciar tratamiento según protocolos de meningitis. Consultar con UCI. Si se confirma *Listeria* en cultivos, suspender ceftriaxona y valorar añadir gentamicina 5 mg/kg/día, y tratar como listeriosis clásica. 4-6 semanas. Si los cultivos son positivos para otro microorganismo, actuar en consecuencia. Si son negativos, valorar la necesidad de antibioterapia según los datos clínicos y analíticos y la evolución clínica.
- En embarazadas, examen obstétrico.

ALTERNATIVA A AMPICILINA O AMOXICILINA EN CASO DE ALERGIA

- Comprobar con una buena anamnesis que existe un antecedente compatible con alergia a penicilina
- Si no se puede descartar y están disponibles, hacer test cutáneo y actuar en consecuencia.
- En caso de ser necesario usar alternativa:
 - o Vía oral: Trimetoprim-sulfametoxazol forte, 1 comprimido cada 8 horas
 - o Vía IV: Trimetoprim-sulfametoxazol, 3-5 mg/kg de trimetoprim cada 6 horas

TABLA RESUMEN

Paciente/clínica		Pruebas diagnósticas	Tratamiento empírico	Seguimiento
Asintomáticos		No	No	Consultar si clínica
No factores de riesgo	Leve	No	No	Consultar si clínica
	Moderada	Opciones: a) No b) HC	No	Si HC positivo, amoxi oral 1g/8h o ampi IV 2g/6h
Factores de riesgo	Leve	Opciones: a) No b) HC	No	Si HC positivo, amoxi oral 1g/8h o ampi IV 2g/6h. Examen obstétrico en embarazadas
	Moderada	HC	Ampi IV 2 g/6h +/- genta	Según cultivos. Examen obstétrico en embarazadas
Grave/meningitis		HC, PL si precede	Ampi IV 2 g/4h + ceftriaxona +/- genta	Según cultivos. Examen obstétrico en embarazadas

HC: hemocultivos. PL: punción lumbar